

Bestrijden van vliegen en knutten

Een goede vliegenbestrijding rond en op de dieren (koeien, ouder jongvee en kalveren) komt het dierenwelzijn ten goede en geeft rust bij het melken en hanteren van de dieren. Hiermee beperkt u tevens de verspreiding van verschillende ziekten die door deze insecten worden overgedragen zoals houw, zomerwrang, blauwtong en schmallenberg.

Zeker de bestrijding van knutten is niet geheel onbelangrijk. De Royal GD heeft afgelopen winter meer afwijkende kalveren aangeboden gekregen voor pathologie in vergelijking met vorig jaar. Pathologisch onderzoek heeft bevestigd dat het bij verschillende van deze kalveren om het schmallenbergvirus ging. Tevens blijkt uit onderzoek van het Royal GD, dat de bedrijfsprevalentie van het schmallenbergvirus op rundveebedrijven van 2015 naar 2017 is verdrievoudigd (van 6% naar 18% bij melkvee, 13% naar 43% bij vleesvee).

Het schmallenbergvirus wordt in augustus, september, oktober en begin november overgebracht door knutten. De schade wordt voornamelijk veroorzaakt na een infectie bij vroeg- en mid-drachtige naïeve dieren. Het gaat daarbij vooral om opbrekers, abortus, doodgeboorte en misvormde kalveren met een gecompliceerd geboorteverloop. Andere verschijnselen bij runderen zijn koorts, diarree en geringe tot ernstige melkproductiedaling.

Naast het preventief en geregeld uitmesten van potstallen en algehele hygiëne levert DAC ZuidOost de volgende middelen om u te helpen in de aanpak van vliegenoverlast:

- **Auriplak®** oorflappen voor pinken en droogstaande koeien (werkingsduur 4 maanden). Wachtijd vlees en melk 0 dagen
- **Spotinor®** pour-on behandeling en preventie van besmetting door luizen en vliegen bij runderen.
- **Deltanil®** pour-on behandeling en preventie van besmetting door luizen en vliegen bij runderen, eventueel in combinatie met het innovatieve **FARMPACK®** en **FLEXIBAG®** doseersysteem voor eenvoudige toediening bij gebruik van een 2,5 liter zak. Wachtijd rundvee vlees- en slachtafval: 17 dagen | melk: 0 dagen.