

Prolapsen



Een darmprolaps, ook wel rectumprolaps genoemd, is een verschijnsel waarbij een stuk endeldarm via de anus naar buiten steekt. Dit komt het meeste voor bij vleesvarkens en jonge gelten, maar kan bij ieder varken voorkomen. Een prolaps is pijnlijk voor het dier en kan snel erger worden als de darm beschadigd of ontstoken raakt. In deze nieuwsbrief worden de risicofactoren voor darmprolapsen op een rijtje gezet.

Risicofactoren

- **Diarree:** irritatie van darmwand
 - Diverse soorten enteritis
 - Wormeninfectie (Ascaris suum) of coccidiose
- Irritatie van de **anus:** toename aantal staartbewegingen
- **Voeding**
 - Teveel vloeibaar voedsel
 - Voeren van gasvormende voeders
 - Abrupte voerverandering
 - Teveel calcium in het voer => blokkade urinebuis => persen bij urineren
 - Chronisch watertekort => constipatie => persen bij ontlasten
 - Laag gehalte aan vezels => constipatie => persen bij ontlasten
 - Te hoog lysinegehalte in het voer
 - Teveel zout in het voer
- **Verweking van vaginaal gebied** (gelten en zeugen)
 - Randon partus
 - Hormonale invloed
 - Mycotoxines
- **Blaasinfecties** => meer persen

Nieuwsbrief hoogtepunten

DARMPROLAPS

RISICOFACTOREN

PIJNBESTRIJDING

- **Verhoogde druk in buikholte**
 - Koude omstandigheden => varkens kruipen meer tegen elkaar
 - Met name in wintermaanden
 - Hoesten
 - Hellende vloer
 - Dracht (voor werpen)
- **Erfelijkheid**
- **Couperen**
 - Te kort couperen => zenuwen rondom anus raken beschadigd
- **Transport**
 - (Te)veel biggen op de wagen
- **Laag geboortegewicht:** vermoedelijk door minder spiervezels
 - Vroeggeboorte
 - Te vroege inductie van het werpproces => onvoldoende ontwikkeling van kringspier
 - Toomgrootte
 - Voeding
- **Antibioticabehandeling**
 - Lincomycine: zwelling rondom anaal gebied (prolaps <72 uur)
- **Schimmels, anders dan mycotoxines**
- Abnormaal gedrag: overmatig **persen** door stress

Therapie

Afhankelijk van hoe ernstig de prolaps is, is het verstandig om het varken apart te zetten. Zo kunnen andere varkens het stuk endeldarm niet beschadigen. Daarnaast kan de prolaps met een hechting (en verdoving) gecorrigeerd worden door de (bedrijfs)dierenarts.

Wanneer darmprolapsen veel voorkomen op het bedrijf is het goed om de oorzaak/oorzaken te achterhalen. Neem hiervoor contact op met uw bedrijfsdierenarts.